




Neutropenia febril en el adulto

Manejo en la primer hora



-
- Piperacilina/tazobactám 4,5 g c/6 h IV ◦ Meropenem 1 g c/8 h IV
 - +
 - Vancomicina 1 g c/12 h IV



AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES

- Duración esperada de la neutropenia (< 500 PMN) <7 días
- Disfunción orgánica aguda
- Comorbilidades
- MASCC ≥21
- Alteración de los signos vitales
- Signo o síntoma clínico diferente a la fiebre
- Foco infeccioso localizado
- Alteración imagenológica y/ o analítica
- Medio social, familiar ó logístico desfavorable

MASCC

Puntuación máxima: 26 puntos
Valor de corte: 21 (S=71%; E=48%; VPP= 94%)

Condición	Puntaje
Gravedad de la enfermedad: leve o ausente*	5
Sin hipotensión arterial	5
Sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4
Tumor sólido u oncohematológico sin IFI	4
Sin deshidratación	3
Gravedad de la enfermedad: moderada*	3
Ambulatorio	3
Menor de 60 años	2

*Se evalúa una sola vez. La gravedad de la enfermedad es valorada según escala visual de 1 a 9, y en referencia a la pregunta formulada al ingreso: ¿cuán enfermo se ve el paciente?: nada: 1-2; leve: 3-4; moderado: 5; grave: 6-7; moribundo: 8-9.
IFI: infección fúngica invasiva. S: sensibilidad; E: especificidad; VPP: valor predictivo positivo.



-
- Piperacilina/tazobactám 4,5 g c/6 h IV ◦ Meropenem 1 g c/8 h IV
 - **Ver** según foco/riesgos agregar vancomicina y/o amikacina



-
- Ciprofloxacina 500 mg c/12 h VO + amoxicilina-ácido clavulánico 1 g c/12 h VO ◦
 - Levofloxacina 750 mg/d VO ◦
 - Clindamicina 600 mg c/8 h VO ◦
 - Azitromicina 500 mg/d VO